

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

18 Stibium Komplex

Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung:

1 Tablette enthält:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Ferrum sulfuric. (HAB 1934) D6 Trit. (HAB, Vorschr. 6) 27 mg

Antimonium sulfur. aurantiac. D4 Trit. 27 mg

Natrium nitric. D4 Trit. 27 mg

Arsenicum album D6 Trit. 27 mg

Mercurius solubilis Hahnem. D6 Trit. 27 mg

Sonstige Bestandteile: Lactose, Magnesiumstearat, Kartoffelstärke..

Tabletten, Originalpackung mit 120 Tabletten.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Nestmann Pharma GmbH, Weiherweg 17,
D-96199 Zapfendorf/Bamberg,
Tel. 09547/92210 Fax 09547/215

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie 18 Stibium Komplex nicht einnehmen?

18 Stibium Komplex soll bei Nierenfunktionsstörungen sowie bei Säuglingen und Kleinkindern nicht angewendet werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

18 Stibium Komplex soll in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis:

In der Homöopathie ist bekannt, daß die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflusst werden kann.

Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, holen Sie medizinischen Rat ein.

Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12mal täglich je 1 Tablette sowie bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich je 1 Tablette vor bzw. zwischen den Mahlzeiten im Mund zergehenlassen.

Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenenendosis.

Dauer der Anwendung:

Ohne medizinischen Rat nicht länger als 1 Woche anwenden.

Hinweise für den Fall der Überdosierung:

Was ist zu tun, wenn 18 Stibium Komplex in zu großen Mengen eingenommen wurde?

Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

Nebenwirkungen:

Nach Einnahme kann Speichelfluß auftreten, das Mittel ist dann abzusetzen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweis:

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Nach Ablauf des auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatums soll das Präparat nicht mehr angewendet werden.

Stand der Information:

Juli 2001