

Gebrauchsinformation
bitte sorgfältig lesen!

Thuja occidentalis

Urtinktur und Flüssige Verdünnungen

Homöopathische Arzneimittel der anthroposophischen Therapierichtung

Zusammensetzung

Arzneimittelbezeichnung	10 ml enthalten:		Vol.-% Alkohol
	Arzneilich wirksamer Bestandteil:		
Thuja occidentalis Ø	Thuja occidentalis Ø	10 ml	69
Thuja occidentalis D1	Thuja occidentalis Dil. D1	10 ml	69
Thuja occidentalis D3	Thuja occidentalis Dil. D3	10 ml	36
Thuja occidentalis D4	Thuja occidentalis Dil. D4	10 ml	18
Thuja occidentalis D6	Thuja occidentalis Dil. D6	10 ml	18
Thuja occidentalis D12	Thuja occidentalis Dil. D12	10 ml	18
Thuja occidentalis D20	Thuja occidentalis Dil. D20	10 ml	18
Thuja occidentalis D30	Thuja occidentalis Dil. D30	10 ml	18

(D2 mit Ethanol 43 Gew.-%, D3 mit Ethanol 30 Gew.-%, ab D4 mit Ethanol 15 Gew.-%)

Darreichungsformen und Packungsgröße

20 ml Urtinktur, Flüssige Verdünnung

Weleda AG

Postfach 1309/1320

D-73503 Schwäbisch Gmünd

Registrierte homöopathische Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Tritt während der Anwendung des Arzneimittels keine Besserung der Beschwerden ein, ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen

Keine bekannt

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Thuja occidentalis Urtinktur und die Flüssige Verdünnung D1 dürfen während der Schwangerschaft nicht angewendet werden. Die Flüssigen Verdünnungen D3 bis D30 sollten in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt

Hinweis

Die Urtinktur und die Flüssigen Verdünnungen enthalten Alkohol, die genauen Angaben in Volumenprozent sind der Tabelle im Abschnitt „Zusammensetzung“ zu entnehmen.

Dosierung und Art der Anwendung

Soweit nicht anders verordnet, 1 - 3 mal täglich 5 - 10 Tropfen mit Wasser verdünnt einnehmen.

Bei Thuja occidentalis Ø und D1 ist eine eventuelle Trübung der Flüssigkeit für Wirksamkeit und Verträglichkeit ohne Belang. Um eine gleichmäßige Verteilung bei der Entnahme zu gewährleisten, sollte die Flasche vor Gebrauch geschüttelt werden.

Nebenwirkungen

Bei der Einnahme von Thuja occidentalis Ø und D1 können Schleimhautreizungen auftreten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

Hinweis

Sie dürfen die Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Stand der Information: September 2005

Ergänzende Information

Die für die Behandlung geeignete Potenzstufe wird vom Arzt nach dem jeweiligen Krankheitsbild ausgewählt und für den Patienten individuell verordnet.