

Upotreba PENTOFURYL -a kod proliva

PENTOFURYL uklanja brzo i sigurno proliv, koji je prouzrokovani uzročnicima osetljivini na nifuroxazid.

Ukoliko lekar drugačije ne odredi, onda će - podeljeno na veći broj pojedinačnih doza - svakodnevno da uzimaju :

odrasli i deca starija od 10 godina

2-4 kapsule ili

4-8 kafenih kašičica sirupa

deca starija od jedne godine

4-6 kafenih kašičica sirupa

odojčad do jedne godine

3-4 kafenih kašičica sirupa

nedonoščad i novorođenčad

1-3 kafenih kašičica sirupa

Kapsule PENTOFURYL-a mogu isto tako da se otvore i sadržaj pomešan sa hranaom ili kašicom onda uzeti.

Duze od 7 dana ili za vreme trudnoće PENTOFURYL samo onda uzimati, ako je to od strane lekara tako određeno.

Έτσι χρησιμοποιείται το PENTOFURYL σε ασθένειες που προκαλούν διάρροια.

To PENTOFURYL therapeuei γρήγορα και αποτελεσματικά τη διάρροια που προκαλείται από μικρόβια ευαίσθητα στην ουσία NIFUROXAZIDE.

Eάν δεν έχει ορίσει διαφορετικά ο γιατρός, η δοσολογία για ενήλικες και παιδιά άνω των 10 ετών έχει ως εξής:

2-4 κάψουλες ή

4-8 κουταλάκια του γλυκού σιρόπι

παιδιά από 1 έτους:

4-6 κουταλάκια του γλυκού σιρόπι

βρέφη έως 1 έτους:

3-4 κουταλάκια του γλυκού σιρόπι

πρόωρα και νεογνά:

1-3 κουταλάκια του γλυκού σιρόπι

Η συνιστώμενη ποσότητα φαρμάκου θα πρέπει να διαιρείται σε περισσότερες δόσεις ημερησίως.

Οι κάψουλες PENTOFURYL μπορούν να ανοιχτούν και το περιεχόμενό τους να χορηγηθεί μαζί με το φαγητό ή τη βρεφική τροφή.

To PENTOFURYL μπορεί να χορηγείται για περισσότερες από 7 ημέρες ή σε περίπτωση εγκυμοσύνης, μόνο μετά από σύσταση του γιατρού.

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Bitte sorgfältig lesen!

 **LINDEN** Arzneimittel-Vertrieb GmbH
Rodheimer Straße 90 . 35452 Heuchelheim

PENTOFURYL Saft®

Wirkstoff: Nifuroxazid

Zusammensetzung:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

1 Teelöffel (5ml) enthält 100 mg Nifuroxazid

Sonstige Bestandteile:

Xanthan Gummi, Natriumhydroxid, Citronensäure-Monohydrat, Saccharose, Bananenaroma, Methyl-4-hydroxybenzoat, Ethanol 96% (V/V), Gereinigtes Wasser

Darreichungsform und Inhalt:

Originalpackung Pentofuryl Saft zu 125 ml enthält 2,5 g Nifuroxazid

Durchfallmittel

LINDEN Arzneimittel-Vertrieb GmbH
Rodheimer Straße 90 - 35452 HEUCHELHEIM
Telefon 0641-96 266 10
Fax 0641-62817

Hersteller:

LAVIPHARM S.A.
AGIAS MARINAS STR.
19002 PEANIA - GREECE

Anwendungsgebiete:

Akute und chronische Durchfallerkrankungen infolge von Infektionen mit nifuroxazidempfindlichen Erregern.

Gegenanzeigen:

Keine.

Hinweis: Die Anwendung während der Schwangerschaft sollte nur unter besonders strenger Indikationsstellung erfolgen.

210442/C



Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Dosierung:

Soweit nicht anders verordnet, nehmen über den Tag verteilt ein :	
Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren	4-8 Teelöffel
Frühgeborene, Neugeborene	1-3 Teelöffel
Säuglinge bis 1 Jahr	3-4 Teelöffel
Kinder ab 1 Jahr	4-6 Teelöffel

Art und Dauer der Anwendung:

Die Suspension ist vor Gebrauch gut zu schütteln. Pentofuryl sollte nur in ärztlich begründeten Ausnahmefällen länger als 7 Tage angewendet werden.

Nebenwirkungen:

Aufgrund des Gehaltes an Methyl-4-hydroxybenzoat (Paraben) können bei entsprechend veranlagten Patienten Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.

Hinweis: 1 Teelöffel (5 ml) enthält 1,1 g Saccharose entsprechend 0,092 BE

Eigenschaften

Das Furandervat Nifuroxazid ist als Chemotherapeutikum besonders zur Behandlung infektiöser Durchfallerkrankungen geeignet. PENTOFURYL ist demnach anzuwenden, wenn krankheitserzeugende Keime (z. B. Escherichia coli oder Staphylokokken) im menschlichen Darm ein Übergewicht erlangen oder wenn bei Kindern im Rahmen von Entzündungen des Mittelohrs oder des Nasen-Rachen-Raums Durchfälle auftreten. Die Wirksubstanz von PENTOFURYL ist sehr gut verträglich und auch für die Verabreichung an Frühgeborene, Neugeborene und Säuglinge geeignet.

Nifuroxazid liegt in PENTOFURYL Suspension so feinverteilt vor, dass ein guter Kontakt der Wirksubstanz mit den Krankheitserregern im Darm gewährleistet ist.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Nach Ablauf des auf der Packung angegebenen Verfalldatums darf Pentofuryl nicht mehr angewendet werden.

Diese Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.

Stand der Information:

01.11.2000

Apothekenpflichtig

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Indicazioni e posologia del PENTOFURYL in caso di malattie diarrhoeiche

PENTOFURYL elimina rapidamente e sicuramente la diarrea provocata da agenti nifuroxazide-sensibili. Se non prescritto altrimenti dal medico curante. PENTOFURYL deve essere preso in più dosi giornaliere :

adulti e bambini al di sopra di 10 anni da 2 a 4 capsule oppure

bambini con età superiore ad 1 anno da 4 a 8 cucchiai da tè di sciroppo

lattanti fino ad 1 anno da 3 a 4 cucchiai da tè di sciroppo

neonati prematuri e neonati da 1 a 3 cucchiai da tè di sciroppo

Le capsule di PENTOFURYL possono essere aperte ed il loro contenuto può essere unito ai pasti o alle pappe e venire così ingerito. PENTOFURYL non deve essere preso per più di 7 giorni di seguito e durante la gravidanza, se non sotto precisa indicazione del medico curante.

Effetti collaterali:

Il contenuto di alchile-4-idrossibenzoati (paraben) può provocare reazioni d'ipersensibilità in pazienti con predisposizione.

Empleo de PENTOFURYL contra enfermedades diarreicas

PENTOFURYL elimina de forma rápida y segura las diarreas provocadas por agentes patógenos sensibles a la nifuroxacida. Si el médico no prescribe en otra forma, se tomarán diariamente, distribuyendo entre varias dosis únicas, los adultos y niños a partir de 10 años 2-4 cápsulas o

4-8 cucharillas de jarabe

los niños a partir de 1 año 4-6 cucharillas de jarabe

los bebés hasta 1 año 3-4 cucharillas de jarabe

los prematuros y recién nacidos 1-3 cucharillas de jarabe

PENTOFURYL Cápsulas pueden tomarse abiertas y mezclarse el contenido con la comida o las papillas y purés. Se puede tomar PENTOFURYL durante más de 7 días o durante el embarazo solamente si su médico se lo ha recomendado.

Efectos colaterales :

Debido al contenido en alquilo-4-hidroxibenzoatos (parabenos) pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad entre los pacientes afectos de la predisposición correspondiente.

Barsak bozukluguna karşı PENTOFURYL'in kullanımı

PENTOFURYL nifuroxazid'e hassas mikroplarla ortaya çıkan barzak bozuklukları çabuk ve güvenilir şekilde yokeder.

Eğer doktor tarafından başka türlü tarif edilmemişse yaşı göre günde teker teker aşağıdaki miktarlara kadar alınır.

10 yaşından yukarı çocuklar ve yetişkinler günde 2 ila 4 Kapsül veya

4 ila 8 çaykaşığı şurup

1 yaşından yukarı çocuklar günde 4 ila 6 çaykaşığı şurup

1 yaşa kadar küçük çocuklar günde 3 ila 4 çaykaşığı şurup

daha küçük bebeklere günde 1 ila 3 çaykaşığı içерiler

PENTOFURYL kapsülleri ayrıca açılarak, içindekiler yemek veya koyu içecekler içine karıştırılarak kullanılabilir. Eğer doktor ayrıca etmemiş PENTOFURYL hamilelikte hiç, hamile olmayanlardada 7 günden fazla alınmamalıdır.

Yan tesirleri :

Içerisinde alkil-4-hidrosibenzoat (paraben) bulundugundan, bu maddeye karsılık alerji olan hastalarda alerjik reaksiyon belirtileri görülebilir.