

vorzeitig abbrechen, kann die gewünschte Wirkung nicht eintreten.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Tyrosur® Gel Nebenwirkungen haben.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrundegelegt:

Sehr häufig:
mehr als 1 von 10 Behandelten

Häufig:
weniger als 1 von 10,
aber mehr als 1 von 100 Behandelten

Gelegentlich:
weniger als 1 von 100,
aber mehr als 1 von 1.000 Behandelten

Selten:
weniger als 1 von 1.000,
aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten

Sehr selten:
weniger als 1 von 10.000 Behandelten
einschließlich Einzelfälle

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes:

Sehr selten kann es zu Überempfindlichkeitserscheinungen, wie z.B. Brennen auf der Haut, kommen.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

5. WIE IST TYROSUR® GEL AUFZUBEWAHREN?

🔑 Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Das Verfalldatum ist auf der Faltschachtel und dem Tubenfalz aufgedruckt. Bitte verwenden Sie die Packung nicht mehr nach diesem Datum.

Nach Anbruch ist Tyrosur® Gel drei Monate haltbar.

Stand der Information:
Juni 2005


**ENGELHARD
ARZNEIMITTEL**
Ihr Partner für die Gesundheit

Stand: 07/05; Pb1609301

Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage / Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Tyrosur® Gel jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder nach einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Tyrosur® Gel und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Tyrosur® Gel beachten?
3. Wie ist Tyrosur® Gel anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Tyrosur® Gel aufzubewahren?

Tyrosur® Gel

Wirkstoff: Der arzneilich wirksame Bestandteil ist Tyrothricin.

100 g Gel enthalten 0,1 g Tyrothricin.

Die sonstigen Bestandteile sind: Cetylpyridiniumchlorid 1 H₂O, Propylenglycol, Ethanol 96 %, Carbomer 40 000 - 60 000, Trometamol, gereinigtes Wasser.

Tyrosur® Gel ist in Packungen mit 5 g (N1) und 25 g (N1) Gel zum Auftragen auf die Haut erhältlich.

1. WAS IST TYROSUR® GEL UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

1.1 Tyrosur® Gel ist ein Lokalanthibiotikum.

1.2 von:

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstraße 3
61138 Niederdorfelden
Telefon: 06101/539-300
Telefax: 06101/539-315
E-mail: info@engelhard-am.de
Internet: <http://www.engelhard-am.de>

1.3 Tyrosur® Gel wird angewendet

zur lindernden Behandlung von kleinflächigen, oberflächlichen, wenig nässenden Wunden mit bakterieller Superinfektion mit Tyrothricin-empfindlichen Erregern.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON TYROSUR® GEL BEACHTEN?

2.1 Tyrosur® Gel darf nicht angewendet werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Tyrothricin oder einem der sonstigen Bestandteile von Tyrosur® Gel sind;
- auf der Nasenschleimhaut.

2.2 Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von Tyrosur® Gel sind erforderlich

bei Anwendung in Augennähe: das Gel darf nicht in die Augen gelangen, da dies zu Brennen führen kann.

Schwangerschaft

Es liegen keine Daten zur Sicherheit einer Anwendung von Tyrosur® Gel bei Schwangeren vor. Das potentielle Risiko für den Menschen ist auf Grund fehlender Tierstudien nicht bekannt. Daher sollen Sie Tyrosur® Gel in der Schwangerschaft nicht anwenden.

Stillzeit

Da nicht bekannt ist, ob Cetylpyridiniumchlorid oder Tyrothricin in die Muttermilch übergeht, sollen Sie Tyrosur® Gel in der Stillzeit nicht anwenden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Warnhinweise zu bestimmten Bestandteilen von Tyrosur® Gel:

Tyrosur® Gel enthält Propylenglycol und kann daher Hautreizungen hervorrufen.

2.3 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Es sind bisher keine Arzneimittel bekannt, welche die Wirkung von Tyrosur® Gel beeinflussen oder durch Tyrosur® Gel beeinflusst werden.

Bitte informieren Sie trotzdem Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder anwenden bzw. vor kurzem eingenommen oder angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

3. WIE IST TYROSUR® GEL ANZUWENDEN?

Wenden Sie Tyrosur® Gel immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage oder nach der Verordnung Ihres Arztes an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

3.1 Art der Anwendung

Zum Auftragen auf die Haut.

3.2 Falls vom Arzt nicht anders verordnet, wird Tyrosur® Gel wie folgt angewendet:

Das Gel wird 2- bis 3-mal täglich in ausreichender Menge aufgetragen.

Wie und wann sollten Sie Tyrosur® Gel anwenden?

Tragen Sie das Gel morgens, (mittags) und abends auf, so dass die betroffenen Hautpartien mit Gel bedeckt sind. Ein Verband ist bei leichteren Verletzungen oder Hautentzündungen an unbedeckten Körperstellen in der Regel nicht erforderlich. Bei größeren Verletzungen oder stark nässenden Wunden empfiehlt sich das Anlegen eines Schutzverbandes, der jeweils nach 1-2 Tagen oder gemäß ärztlicher Anweisung erneuert werden sollte.

Wie lange sollten sie Tyrosur® Gel anwenden?

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach dem klinischen Bild.

Wenn sich die Beschwerden verschlechtern oder wenn innerhalb einer Woche keine Verbesserung eintritt, sollten Sie unbedingt Ihren Arzt um Rat fragen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Tyrosur® Gel zu stark oder zu schwach sei.

3.3 Wenn Sie eine größere Menge Tyrosur® Gel angewendet haben, als Sie sollten:

Es sind keine Folgen zu erwarten. Führen Sie die Behandlung wie in der Dosierungsanleitung angegeben fort. Sollten Sie jedoch ungewöhnliche Symptome feststellen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Arzt in Verbindung.

3.4 Wenn Sie die Anwendung von Tyrosur® Gel vergessen haben:

Holen Sie eine vergessene Behandlung nach und setzen Sie die Therapie in gewohnter Weise fort.

3.5 Auswirkungen, wenn die Behandlung mit Tyrosur® Gel abgebrochen wird:

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach Schwere und Verlauf des Krankheitsbildes. Wenn Sie die Behandlung mit Tyrosur® Gel