

Kiltix[®] Halsband für große Hunde

Halsband gegen Zecken und Flöhe



Zusammensetzung : Ein Halsband mit einem Gewicht von 45 g (66 cm Länge) enthält:

Wirkstoffe:

4,5 g Propoxur (2-Isopropoxyphenyl)(methylcarbamat),
1,013 g Flumethrin ((±)- α -Cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl-3-(β ,4-dichlorostyryl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylate).

Sonstige Bestandteile, deren Kenntnis für eine zweckgemäße Verabreichung des Mittels erforderlich ist: Dibutyladipat, Propylenglycoloctanoatdecanoat, Epoxidiertes Sojabohnenöl, Stearinsäure, Titandioxid (E171), Eisenoxid (E 172), Polyvinylchlorid.

Darreichungsform : Halsband von 66 cm Länge (45 g).

Zieltierarten : Großer Hund

Kiltix[®] Halsband für große Hunde

- Anwendungsgebiete :** Zur Bekämpfung des Holzbockes (*Ixodes ricinus*), der Braunen Hundezecke (*Rhipicephalus sanguineus*) und von Flöhen (*Ctenocephalides canis / felis*) bei Hunden sowie zum Schutz vor Neubefall. Das Halsband wirkt nach dem Anlegen gegen Zecken und Flöhe bis zu 7 Monate.
- Gegenanzeigen :** Tiere mit großflächigen Hautläsionen sind von der Behandlung auszuschließen. Nicht bei kranken und rekonvaleszenten Tieren anwenden. Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.
- Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart :** Siehe Abschnitt „Gegenanzeigen“.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung :** Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:
Das Halsband ist für den äußerlichen Gebrauch als Akarizid und Insektizid bestimmt, und darf weder von Hunden noch von Menschen innerlich eingenommen werden.
Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:
Beim Anlegen ist übermäßiger Kontakt mit dem Halsband zu vermeiden. Nach der Anwendung sind die Hände gründlich zu waschen. Personen, die auf die Inhaltsstoffe des Halsbandes empfindlich reagieren, sollten den Kontakt mit dem Halsband vermeiden.
Warnhinweis: Tiere, die ein Kiltix[®] Halsband für große Hunde tragen, sind von Kleinkindern und Säuglingen fernzuhalten.
- Nebenwirkungen :** Gelegentlich kann in den ersten Tagen nach Anlegen des Halsbandes ein leichter Juckreiz auftreten. Beim Auftreten von Überempfindlichkeiten ist ein sofortiges Abnehmen des Halsbandes erforderlich. Falls nötig, sind die unter dem Abschnitt „Überdosierung“ genannten Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Kiltix[®] Halsband für große Hunde

Anwendung während Trächtigkeit und Laktation :

Zur Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation können keine Angaben gemacht werden. Da beide Wirkstoffe weder als embryotoxisch noch als teratogen oder reproduktionstoxisch eingestuft sind, sind keine entsprechenden Effekte bei trächtigen oder laktierenden Hündinnen zu erwarten.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln :

Keine bekannt.

Dosierungsanleitung mit Art und Dauer der Anwendung :

Große Hunde erhalten ein Halsband von 66 cm Länge (45 g).

Band zum Befestigen am Hals.

Das Halsband aus der versiegelten Schutzpackung entnehmen, entrollen und die Plastikstege auf der Innenseite des Halsbandes entfernen. Das Band locker um den Hals legen und das überstehende Ende durch die Laschen ziehen. Der korrekte Sitz des Halsbandes ist regelmäßig zu kontrollieren. Das Halsband soll ständig getragen werden. Es wirkt sowohl beim Laufen als auch in der Ruhephase der Tiere. In Einzelfällen ist während des Tragens des Halsbandes ein Befall mit Zecken möglich, die sich allerdings nur einbohren und spätestens nach 3 Tagen abfallen, in der Regel ohne Blut gesaugt zu haben. Wirksamkeit und Wirkungsdauer des Halsbandes sind abhängig von Länge, Dichte und Pflegezustand des Haarkleides sowie vom Parasitendruck. Gegebenenfalls kann bei nachlassender Wirksamkeit ein vorzeitiger Wechsel des Halsbandes angezeigt sein. Um bei Tieren mit struppigem, verfilztem oder verfettetem Haarkleid eine optimale Schutzwirkung durch das Halsband zu erzielen, sollten diese Tiere vor dem Anlegen des Halsbandes gebadet und shampooiert werden. Geht der Hund schwimmen bzw. wird er gebadet, so ist das Halsband unmittelbar vorher abzunehmen und nach dem Trocknen des Fells wieder anzulegen. Durch häufiges Naßwerden (Regen, Schwimmen, Baden) kann die Wirksamkeit des Halsbandes beeinträchtigt sein.

Hinweis: Flöhe befallen häufig das Lager und die Umgebung des Haustieres (Teppiche und Gardinen), die mit einem angemessenen Ungeziefermittel behandelt

Kiltix[®] Halsband für große Hunde

und regelmäßig staubgesaugt werden sollten. Diese Maßnahmen tragen zur Reduzierung des Flohbefalls in der Umgebung bei und verlängern den Schutzeffekt gegen Neubefall.

Überdosierung :	Überdosierungen sind nicht zu erwarten. Umfangreiche kontrollierte Prüfungen mit gleichzeitig zwei applizierten Halsbändern "Kiltix [®] für große Hunde" bei Hunden unterschiedlicher Rasse, Alter und Gewicht erbrachten keine Anzeichen behandlungsbedingter lokaler oder systemischer Unverträglichkeiten (Klinische Chemie, Hämatologie, Cholinesterase, Urinstatus, Verhaltensparameter). Beim Auftreten von klinischen Anzeichen einer Carbamatvergiftung besteht die Behandlung aus symptomatischen Maßnahmen sowie intravenöser Verabreichung des Antidots Atropin.
Wartezeit :	Nicht zutreffend.
Unverträglichkeiten :	Keine bekannt.
Dauer der Haltbarkeit des Tierarzneimittels nach Anbruch des Behältnisses :	Das Halsband ist nach Anbruch der Originalpackung zur sofortigen Anwendung bestimmt.
Besondere Lager- und Aufbewahrungshinweise :	Von Nahrungsmitteln und Getränken sowie von Futtermitteln getrennt aufbewahren.
Art und Beschaffenheit des Behältnisses :	Schachtel mit 1 eingesiegelten Halsband.
Verschreibungsstatus :	Apothekenpflichtig
Zusätzliche Hinweise :	Das Halsband ist toxisch für Bienen und Fische.